

Ficam W

15 g

Insecticida para el control de una extensa variedad de plagas de insectos en Salud Pública

Peligroso para el medio ambiente

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo, ni la nube de pulverización.
- Uséense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Tóxico

- Nocivo en contacto con la piel.
- Tóxico por inhalación y por ingestión.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION

O ACCIDENTE : Es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa.

La intoxicación puede provocar:

Sintomas Muscarínicos: bradicardia, bronco espasmo, broncorrea, sialorrea, sudoración, lacrimo, vómitos, diarrea, miosis y incontinencia.

Sintomas Nicotínicos: taquicardia, hipertensión, midriasis, fasciculaciones, calambres y debilidad muscular.

Parálisis respiratoria.

Sintomas Neurológicos: depresión, ansiedad, confusión, arreflexia, ataxia, convulsión y coma.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

Consejos terapéuticos:

Descontaminación digestiva y cutánea inmediata.

Administre carbón activado a una dosis de 25 a 100 g en adultos y de 25 a 50 g en niños y sulfato sódico - 30 g en adultos - en ausencia de diarrea.

Administrar atropina para combatir los síntomas muscarínicos a una dosis de 2-4 mg en adulto y en niños menores de 12 años de 0,05 - 0,1 mg /Kg repetidas cada 15 minutos, hasta que aparezcan signos de atropinización.

Control de acetilcolinesterasa sérica.

Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana, Succinilcolina y otros agentes colinérgicos. Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR EL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:**Teléfono: 91 562 04 20**

- No espolvorear sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen o, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas.
- Plazo de seguridad recomendado : 48 horas.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.

Aplicaciones

Se recomienda el uso de Ficam W para el control de cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos adultos, plagas de insectos en productos almacenados, plagas de alfombras, avispas, abejas, escorpiones, pececillos de plata, escarabajos, tijeretas, grillos, polillas, arañas, cochinillas, cienpiés y milpiés. Ficam W puede emplearse dentro y en las proximidades de edificios, incluyendo casas, apartamentos, hoteles, barcos y aviones.

Modo de empleo

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Aplicación localizada por pulverización previa dilución del producto en agua, dirigida a superficies, zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea.

Puede aplicarse en todas aquellas superficies sobre las que se pueda utilizar agua.

Verter en el pulverizador la cantidad de agua y producto requerida en función del problema a combatir (ver tabla). Cerrar el pulverizador y agitar antes de usar y después de periodos de descanso. La mezcla de Ficam W y agua es estable hasta la aparición de un tinte marrón. Para el tratamiento de superficies, utilícese una boquilla de chorro plano con una salida de 0,5-0,7 litros por minuto. Para rociar una sola tira, por ejemplo en la unión de pared y suelo, mantener la boquilla a unos 50 cm de la superficie a rociar y proceder a una velocidad de 50 cm por segundo. Esto producirá una tira de 0,8 metros de ancho. En grandes superficies, por ejemplo alfombras, superponer las tiras parcialmente.

Esto asegurará una cobertura uniforme.

Para grietas y fisuras utilícese una boquilla de salida fina o una extensión especial.

Pulverizar los lugares frecuentados por los insectos y las zonas de reproducción, prestando especial atención a grietas y rendijas, zonas de detrás o debajo de maquinaria, mobiliario o tuberías que son refugios comunes de las cucarachas.

Para el control de hormigas, rociar dentro y alrededor de los nidos, sendas y áreas de alimentación.

Un tratamiento perimetral alrededor de los edificios, prestando especial atención a los puntos de entrada, mejorará la eficacia del tratamiento.

En tratamientos de control de moscas, la mezcla con azúcar actúa como atrayente, estimulando al insecto a permanecer en la superficie tratada el tiempo suficiente para recibir una dosis mortal de insecticida.

Ficam W es igualmente adecuado para el control de abejas salvajes y avispas. Al no provocar la excitación de los insectos, el tratamiento resulta más seguro para el aplicador.

Rociar a fondo la entrada al nido y proximidades.

Advertencia al usuario

Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto.

El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Dosis recomendadas de aplicación

Dosis normal: 1 sobre = 15 g en 5 litros de agua (0,3%)

Para el control de cucarachas en la mayoría de las situaciones y plagas de todos los demás insectos rastreros y mosquitos adultos en todas las situaciones.

Dosis especial: 2 sobres = 30 g en 5 litros de agua (0,6%)

Para el control de cucarachas en situaciones especiales, es decir:

- Donde haya infestaciones intensas
- Donde se requiera un largo período de control.
- Donde las condiciones sean particularmente poco higiénicas.

Control de moscas. Incluyendo moscas domésticas y moscones.

1 sobre = 15 g + 50 g de azúcar en 5 litros de agua (0,3% + 1% de azúcar)

5 litros de caldo cubren aproximadamente 125 m²

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

Uso ambiental: Exclusivamente por personal especializado

Inscrito y Distribuido por :

Bayer CropScience S.L.

Pol. Ind. El Plá, parcela 30

46290 Alcaicer (Valencia)

Tel. : 96 196 53 00

® Marca Registrada de Bayer

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado

a entregarlo en los puntos de recepción de sistema integrado de gestión SIGFITO.

Ficam W - 15 g - ES - ES05630958C - *ARTICLE 04140272*

Composición: Bendiocarb 80.0% p/p

excipientes csp 100.00% p/p

Polvo mojable

Nº de registro DGSP: 07-30-01267