

GEBRUIKSVOORSCHRIFT MAXFORCE QUANTUM (JULI 2011)

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de faraomier, de spookmier en de Argentijnse mier, zowel binnen als buiten.

Bij gebruik buiten mag het middel uitsluitend worden aangebracht in de nestingen van mierenesten.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

Het middel is bijzonder effectief tegen faraomieren (*Monomorium phraonis*) en de zwart-bruine wegmier (*Lasius niger*). Andere (exotische) mieren die met het middel kunnen worden bestreden zijn de spookmier (*Tapinoma melanocephalum*) en de Argentijnse mier (*Linepithema humile*).

Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt voor het uitzetten als lokaas, in o.a. de volgende situaties:

Opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten	Huishoudens, restaurants inclusief keukens, slachthuizen, opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, gemeentehuizen, bioscopen etc.
--	---

Buiten

In de nestingen van mierenesten

Maxforce Quantum cartridges dienen te worden gebruikt met behulp van hiervoor geschikte pistolen. Als een cartridge slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, deze uit het pistool verwijderen en afsluiten met de bijgevoegde afsluiting.

Toepassing:

Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van kinderen en (huis)dieren.

Bij gebruik binnen, bewoners aangeven dat schoonmaken en verwijderen van lokaas punten moet worden voorkomen. Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren. Bij grote infestaties, dienen de lokaaspunten regelmatig te worden gecontroleerd en verversd daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen of plaatsen die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die recent zijn behandeld met andere insecticiden of waar het lokaas kan worden vervuild met andere insecticiden.

Dosering binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een keuken van 10 m² met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter van een mieren looppad.

Bij gebruik buiten, *dient* het middel te worden aangebracht in de ingangen van het nest. Als het mierennest zich bevindt op een onbeschutte plaats, toepassing alleen uitvoeren als geen regen binnen 24 uur wordt verwacht. In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen.

Dosering buiten: 2 gram van het middel rechtstreeks in het nest aanbrengen. Na 5 tot 7 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald.

Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht 7 dagen na aanbrengen van het middel. De meeste mierennesten zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie, kan het plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren. Aangebrachte lokaas punten blijven ten minste 12 weken effectief. Zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal her-infestatie worden voorkomen.