

# Baycidal®

Le larvicide à large spectre  
qui préfère prévenir que guérir.



- Excellente efficacité contre les larves de mouches, ténébrions et vers à queue
- Prévient l'apparition des insectes adultes

> Poudre mouillable à pulvériser



Désinsectisation des bâtiments - tous types d'élevages



Bayer Environmental Science

## Dose

- 20 grammes de Baycidal WP25 pour 10 m<sup>2</sup> de surface traitée
- Baycidal WP25 est une poudre mouillable à diluer dans l'eau. La quantité d'eau dépend du matériel de pulvérisation utilisé :

	Baycidal WP25	Eau	Surface traitée
Arrosoir	20 grammes	10 Litres	10 m <sup>2</sup>
Pulvérisateur à dos	200 grammes	8 à 10 Litres	100 m <sup>2</sup>
Pulvérisateur agricole	2 kg	200 à 300 Litres	1000 m <sup>2</sup>



### Contre les ténébrions en volaille de chair

Pendant le vide sanitaire, avant l'entrée des poussins ou des dindonneaux pulvériser Baycidal WP25 sur la litière, en insistant le long des murs (50cm) et sous les assiettes d'alimentation.



### Calendrier de traitement

Pour un contrôle optimal de la population de ténébrions, effectuer un traitement à chaque bande, dès l'apparition des premiers insectes.



### Contre les mouches et les moucheron

■ **Bovins, ovins, caprins sur litières** : dès l'apparition des premiers insectes, traiter une bande de 50 cm autour des cases, autour des poteaux et sous les mangeoires. Renouveler toutes les 2 à 3 semaines.

■ **Porcheries sur caillebotis** : traiter les caillebotis de manière préventive au début de chaque lot. En cas d'infestation massive, traiter simultanément toutes les salles infestées, et renouveler le traitement 10 et 20 jours plus tard.

■ **Production bovine sur caillebotis (veaux, taurillons ...)** traiter les caillebotis dès l'apparition des premiers insectes puis renouveler toutes les 2 à 3 semaines.



↘ = zone traitée par Baycidal WP 25

■ **Dans les fosses profondes en élevage de poudeuses**, traiter le sommet de chaque andin sur une largeur de 1 mètre, tous les sept à dix jours.

■ **Sur les fumières**, traiter le fumier frais dès son arrivée, puis renouveler toutes les 6 semaines.



### Contre les vers à queue dans les fosses à lisier

Traiter les fosses de stockage extérieures. Renouveler en cas de besoin.

### Pour un programme complet de désinsectisation

Utiliser Baycidal WP25 en combinaison avec un adulticide.

### Précautions d'usage :

- Lire les étiquettes et fiches de sécurité avant usage.
- Porter un équipement de protection adapté.

Numéro d'AMM	9300273
Composition	Triflumuron 25 %
Classement toxicologique	Xn, nocif
Conditionnement	1 kg, 500 g

