



## Aerosol de descarga total 150 ml

Insecticida por nebulización automática para el tratamiento en interiores contra insectos rastreros y voladores (cucarachas, mosquitos, moscas, polillas) y otros artrópodos (garrapatas, arañas).

### Composición:

Ciflutrín 0,1%

Alcohol isopropílico, nafta aromática y propelente csp: 100%

**Donde se utiliza:** SOLFAC Automatic Forte permite una intervención fácil y práctica en: almacenes, depósitos: medios de transporte, aviones, barcos, trenes, autobuses; contenedores; locales públicos, hoteles, etc.

**Como se utiliza:** A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Cerrar puertas y ventanas, oprimir la válvula y colocar el envase en posición vertical, a ser posible en el centro del área a tratar, evitando permanecer durante la nebulización del producto, que se completa en unos 3 minutos.

Después de un mínimo de 12 horas, ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto, y proceder a la recogida del envase vacío.



Oprimir la válvula hasta el fondo.

**Precauciones:** Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.

Menténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Úsense indumentaria y guantes de protección de PVC o de caucho nitrílico.

No pulverizar sobre alimentos o utensilios de cocina.

No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele el envase).

**Dosificación:** Un envase de 150 ml es suficiente para tratar un volumen aproximado de 100 m<sup>3</sup>.

Para lugares de superior volumen, aumentar proporcionalmente el número de nebulizadores.

Usos autorizados:

Uso ambiental: exclusivamente por personal especializado.

**Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:**

La intoxicación puede producir:

- Irritación de ojos y piel.
- Alteración del Sistema Nervioso Central.
- Neumonía química por aspiración.

Primeros auxilios: retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.

Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.

Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.

Controle la respiración.

Si fuera necesario, respiración artificial.

Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

Consejos terapéuticos: Tratamiento sintomático.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.  
Tel. 91 562 04 20.**

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Úsese en lugares bien ventilados.

Mantener a temperaturas superiores a 0°C. Evitar la congelación.



**EXTREMADAMENTE  
INFLAMABLE**



**NOCIVO**

Extremadamente inflamable. Nocivo por ingestión.  
Irrita la piel. La inhalación puede provocar  
somnia y vértigo.

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo tóxico por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



***Solfac Automatic Forte***

Nº. registro DGSP: 06-30-00294

***Inscrito y Distribuido por:***

Bayer CropScience S.L.

Pol. Ind. El Plá, parcela 30

46290 Alcacer (Valencia)

Tel. : 96 196 5300

® Marca Registrada de Bayer