

Quick Bayt®

Indicaciones:

Cebo insecticida para el control de la mosca doméstica y moscas no chupadoras. Es un cebo azucarado que contiene imidacloprid y dos atrayentes, lo que le proporciona mayor eficacia.

Área de aplicación: Uso ganadero.

Para aplicar en granjas, establos, explotaciones ganaderas etc...

Uso exclusivo por personal especializado.

Modo de empleo:

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Iniciar el tratamiento al inicio de la temporada de moscas para impedir su masiva proliferación.

Repetir el tratamiento cuando no quede producto o se vea cubierto de suciedad.

Se recomienda esparcir pequeñas cantidades en los lugares más frecuentados por las moscas.

El contenido del envase de 50 g es suficiente para una superficie de 25 metros cuadrados.

En forma de gránulos, esparcir en superficies secas y planas (ej.: repisas de ventanas, marcos, etc) directamente o en cartones. No amontonarlos.

Evitar zonas muy sucias.

En forma de pasta, disolver el contenido del sobre de 50 g en 35 ml de agua. Después de 15 minutos la pasta queda lista para aplicar. Pintar pequeños parches en paredes, vigas, marcos etc,... donde las moscas se posan habitualmente. Limpiar la brocha con agua templada.

Consejos de prudencia:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Úsense guantes adecuados.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

No existen evidencias de intoxicación en humanos.

En animales de experimentación provoca apatía, alteraciones respiratorias, temblores y calambres musculares.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión y si la persona está consciente provoque el vómito.
- Manténgase al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Clave DPP

Consejos terapéuticos:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de consciencia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

Teléfono (91) 562.04.20.

Composición:

Ingrediente activo:

Imidacloprid 0,50%

Muscalure 0,10%

Excipientes:

Atrayente LEJ 0,25%

Sustancia de sabor amargo 0,01%

Resto de excipientes c.s.p. 100%

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo cual el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Autorizado para uso ganadero. Registrado en la S.G.S.A. con el n: 0269-P

Registrado por:

Bayer CropScience S.L.

Polígono Ind. El Pla, Parc. 30

46290 Alcácer (Valencia) - España